

Falcões é uma referência de manejo, reprodução e reabilitação de aves de rapina silvestres. No parque dos falcões, são criados oito Corujas Murucututu, sendo cinco fêmeas e três machos. Três espécimes, sendo duas fêmeas e um macho, vivem em semiconfinamento e cinco espécimes vivem em confinamento. Todos os animais já atingiram a fase adulta. Alimentam-se de pintos, codornas, ratos e carangueijos-de-água-doce. Nunca foram vermifugadas e são pulverizadas para combater ectoparasitas. O reprodutor foi capturado pela Polícia Ambiental no município de Areia Branca-SE e levado ao Parque dos Falcões. A matriz foi capturada pelo IBAMA no município de Imperatriz-MA e levada ao Parque dos Falcões. Os outros seis espécimes são oriundos dos cruzamentos dos reprodutores. Os ectoparasitas foram procurados manualmente com auxílio de pinças, fazendo vistoria direto nas penas dos animais. Foram feitas duas coletas de fezes com intervalo de quinze dias. Todas as amostras foram armazenadas em coletores universais, identificados e acondicionados em caixa isotérmica e encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Veterinária do Hospital Veterinário da Faculdade Pio Décimo, Aracaju-SE. Foram processadas pelas técnicas de Hoffman e cols e Willis modificado, sendo posteriormente observadas em microscópio óptico com aumento de 400 vezes. Não foram encontrados ectoparasitas nas Corujas Murucututu, *P. perspillata*, e não foram identificados ovos ou oocistos de parasitas gastrintestinais pelas técnicas utilizadas. Pesquisa desenvolvida em cinco aves silvestres da Ordem Strigiformes em São Paulo também não identificaram ovos ou oocistos de parasitas gastrintestinais através das técnicas de exame direto, Faust e o Método de Willis. Não há dados na literatura consultada que descrevam quais fatores podem estar associados à presença de endoparasitas nesta espécie, sendo necessários estudos mais aprofundados que indiquem a epidemiologia e métodos diagnósticos mais adequados para a identificação de parasitas gastrintestinais das Corujas Murucututu, *Pulsatrix perspillata*.

Palavras-chave: Ectoparasitas; Endoparasitas; Corujas Murucututu;

ANIMAIS SILVESTRES

P-317

IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL ANTROPOGÊNICO EM TRATO DIGESTIVO E COMO POSSÍVEL CAUSA MORTIS DE DE CACHORRO-DO-MATO (*CERDOCYON THOUS*) LINNAEUS, 1766

Janis Cumming Hohlenwerger; Miriam Flores Rebolças

Este trabalho relata a ingestão de saco plástico por um cachorro-do-mato. No dia 28 de setembro de 2011 foi encontrado morto um indivíduo da espécie *Cerdocyon thous*, na área do canteiro de obras do projeto C1 YAMANA Gold, Santa Luz – BA. Tratava-se de um indivíduo juvenil, macho, pesando 1,5 Kg e CT: 80 cm. O animal foi encaminhado para o Centro de Triagem da equipe de resgate de fauna onde foi realizada necropsia. O escore corporal apresentava-se ruim, não havia presença de ectoparasitas. As mucosas estavam levemente hipocoradas, sem sinais de lesões traumáticas aparentes. Com a abertura da cavidade abdominal, foi observada uma alteração da posição do estômago, presença de gases e impactação. Retirou-se o trato gastrintestinal sendo analisado separadamente. Após aberto o estômago observou-se o conteúdo impactante próximo ao piloro semelhante a material plástico flexível, observou-se também a presença de parasitos. O fígado apresentava bordas levemente abauladas e manchas puntiformes esbranquiçadas. Os outros órgãos avaliados não apresentavam lesões aparentes. Devido à tentativa de ocultar sua doença perante os predadores, os animais silvestres só demonstram os sinais de enfermidade quando em estágio avançado, muitas vezes na fase terminal, somente após a necropsia é possível determinar a *causa mortis*, sendo esta

considerada uma importante ferramenta para conservação das espécies. A presença de material estranho no estômago leva a crer que a obstrução causou uma torção gástrica, gerando diversas alterações na fisiologia digestiva do animal, estando relacionada com a possível *causa mortis*. A grande quantidade de endoparasitos observada no trato gastrintestinal está relacionada a debilidade do hospedeiro. As alterações macroscópicas observadas no fígado sugerem um processo inflamatório, porém se faz necessário uma avaliação histopatológica. Devido à dificuldade do trabalho a campo e de armazenamento de material biológico, não foi possível realizar exames microscópicos, sendo apenas observados achados macroscópicos. A ingestão de lixo por animais silvestres é um fato crescente, evidenciando que estes são afetados diretamente pela expansão humana e perda de habitat. A saúde humana, animal e vegetal estão ligadas pelas inter-relações ecológicas dos ecossistemas terrestres e vale ressaltar a importância da conscientização da população em relação às ameaças sofridas pela fauna brasileira, principalmente relacionada à poluição ambiental.

ANIMAIS SILVESTRES

P-318

INFECÇÃO ENDOPARASITÁRIA ENTRE PRIMATAS DE ESTIMAÇÃO NO ACRE, BRASIL – UM RISCO ZONÓTICO E ECOLÓGICO POTENCIAL

Luciana dos Santos Medeiros¹; Soraia Figueiredo de Souza¹; Yuri Karaccas de Carvalho¹; Giovana Barbosa Morais²; Eduardo Cavalcante das Neves²; Charles Pelizzari³

¹Docente do curso de graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Acre – UFAC. lusmedeiros@yahoo.com.br; soraiasouza@yahoo.com.br; ykaracas@yahoo.com.br; ²Estudante de graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Acre – UFAC.gjh. barbosa1@gmail.com ; nevesec@gmail.com; ³Médico Veterinário da Empresa Clínica Especializada em cães e gatos. E-mail: charlespelizzari@yahoo.com.br.

No Brasil existem leis que proíbem a posse de primatas como animais de estimação, entretanto muitas espécies de primatas permanecem como animais de estimação populares na região Amazônica Brasileira. Estudos prévios demonstraram que diversas espécies de primatas podem ser infectadas por patógenos com potencial para infecção em humanos. Adicionalmente, primatas podem ser infectados por patógenos de origem humana. Esta situação em particular pode oferecer riscos ao Bioma Amazônico já que os animais podem ser reintroduzidos na natureza, onde irão formar grupos com primatas selvagens. Para determinar esse risco e a carga de endoparasitismos entre primatas de cativeiro doméstico no Acre, foram coletadas amostras de fezes apropriadas de todos os primatas recolhidos pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) no estado do Acre, entre os anos de 2012 e 2013. As amostras foram analisadas através do exame direto das fezes, exame de flutuação com solução hipersaturada de cloreto de sódio e exame de sedimentação. Dentre os 14 animais recolhidos, apreendidos ou entregues voluntariamente, foram encontrados 2 animais (14,3%) infectados por *Strongyloides sp.*. Os parasitas do gênero *Strongyloides sp.* são parasitas zoonóticos e apresentam uma alta frequência em regiões tropicais e subtropicais. Esse estudo é o primeiro a promover informações sobre carga parasitária entre primatas de estimação no estado do Acre. Apesar da baixa prevalência de infecção parasitária encontrada, recomenda-se triagem e vermifugação frequente de primatas capturados e apreendidos, devido ao potencial de infecção desses animais por endoparasitas zoonóticos como as espécies de *Strongyloides sp.*

Palavras-chave: Primatas, Endoparasitas, Acre